

Zeldzame vogels in België in 2005

Drieëndertigste rapport van het Belgisch Avifaunistisch Homologatiecomité

PETER ADRIAENS, MARNIX VANDEGEHUCHTE EN DE LEDEN VAN HET BAHC

Hoogtepunten

- 2e Blauwstaart *Tarsiger cyanurus*
- 2e Izabeltapuit *Oenanthe isabellina*
- 2e en 3e Grijs Wouw *Elanus caeruleus*
- 3e Reuzenzwartkopmeeuw *Larus ichtyaetus*
- 3e Rotszwaluw *Ptyonoprogne rupestris*
- 3e, 4e en 5e Mongoolse Pieper *Anthus godlewskii*

Inleiding

Dit rapport, dat gezamenlijk werd opgesteld door het Belgisch Avifaunistisch Homologatiecomité (BAHC) en de Commission d'Homologation (CH), behandelt de aan homologatie onderworpen vogeltaxa die waargenomen werden op Belgisch grondgebied in 2005. Het rapport vermeldt ook enkele oudere gevallen, die nog niet eerder gepubliceerd werden.

Een woordje uitleg over moeilijker beoordeeltaxa

Sommige beoordeeltaxa zijn in het veld moeilijk te herkennen en zijn nog moeilijker te beoordelen achteraf. Het gaat hierbij vaak om subtiële ondersoorten of recente 'splits'. Om zulke vogels goed te kunnen beoordelen, is vaak meer nodig dan enkel een beschrijving; ook foto's of geluidsopnamen worden soms gevraagd. De vraag om uitgebreidere documentatie dan gewoonlijk kan voor ergernis zorgen bij waarnemers. Daarom vatten we hieronder samen om welke taxa het precies gaat en waarom de documentatie zo uitgebreid mogelijk moet zijn.

Taigarietgans *Anser fabilis fabalis*

Wat Taigarietgans betreft, is het BAHC voorstander van een heel voorzichtige aanpak. Voorlopig doet het comité liever geen uitspraak over solitaire exemplaren, omdat er nog maar relatief weinig literatuur over de herkenning van deze ondersoort verschenen is en omdat de variatie bij Toendrarietgans toch aanzienlijk blijkt. De determinatie van solitaire exemplaren steunt voornamelijk op structurele kenmerken (snavelvorm, snavelengte, kopvorm, lengte van de hals, ...) die lang niet altijd eenvoudig te interpreteren zijn in het veld, laat staan in een beschrijving te vatten. De aanpak is dus wat vergelijkbaar met die voor IJslandse Grutto voor 1999, toen deze ondersoort nog gehomologeerd moest worden: enkel groepjes komen in aanmerking voor aanvaarding. Foto's en beschrijvingen van solitaire exemplaren worden ondertussen uiteraard zorgvuldig bijgehouden en zullen hopelijk in de toekomst beter beoordeeld kunnen worden.

Groenlandse Kolgans *Anser albifrons flavirostris*

Een gele of oranje snavel is op zich niet voldoende om de vogel met zekerheid als Groenlandse Kolgans te bestempelen. Gewone Kolgans *A. albifrons albifrons* heeft meestal ook een kleine hoeveelheid geel in de overigens roze snavel (cf. Cramp & Simmons 1988); er is variatie, waardoor sommige vogels een grotere hoeveelheid geel hebben dan de meeste. Ook moeten we tegenwoordig rekening houden met hybride ganzen en terugkruisingen; het is b.v. lang niet ondenkbaar dat een "grote Kolgans met stevige, oranje snavel" wel eens een terugkruising kan zijn met Grauwe Gans...

Het verenkleed van zowel gewone als Groenlandse Kolgans is variabel; gewone Kolganzen met donkerder bruin verenkleed dan gewoonlijk overlappen in dit opzicht met blekere exemplaren van Groenlandse Kolgans (vooral eerstejaars-vogels).

Om deze redenen en omdat er in de literatuur nog niet veel verschenen is over het onderscheid tussen de ondersoorten, is het BAHC opnieuw voorstander van een voorzichtige aanpak. Concreet betekent dit dat voorlopig enkel typische exemplaren aanvaardbaar zijn, liefst gedocumenteerd met foto's. "Typisch" betekent dat volgende kenmerken aanwezig moeten zijn:

- iets groter dan gewone Kolgans, met iets langere hals en langere snavel
- Verenkleed duidelijk donkerder en meer effen bruin dan bij gewone Kolgans, met bruinere grondkleur van de buik, smallere witte flankstreep, smallere lichte eindband aan staart en dunnere lichte toppen aan grote dekveren. Weinig of geen lichte randen aan dekveren en tertials.
- Vrijwel volledig felgele of oranje snavel.

Beschrijvingen en foto's van exemplaren die niet helemaal aan deze criteria voldoen, zijn wel steeds welkom en zullen zorgvuldig worden bijgehouden om beoordeeld te worden wanneer er meer bekend is over de verschillen tussen de ondersoorten.

Steppebuizerd *Buteo buteo vulpinus*

De herkenning van deze ondersoort wordt sterk bemoeilijkt door de vele tussenvormen met gewone Buizerd *B. buteo buteo*. Bovendien lijken ook sommige gewone Buizerds kenmerken te tonen van Steppebuizerd, zoals opvallend rossige tinten in het verenkleed (Kehoe 2006).

Het BAHC beoordeelt enkel vangsten en vondsten van Steppebuizerd, geen veldwaarnemingen, omdat dan ook de afmetingen van de vogel (biometrie) beschikbaar zijn. Ringterugmeldingen kunnen bovendien zekerheid geven over de precieze herkomst van de vogel.

De CH voerde recentelijk nog een herziening van de Waalse gevallen door, waarbij een geval uit 1966 niet langer aanvaardbaar werd geacht. Er blijven momenteel nog drie Belgische gevallen over: een vondst te Wijnegem in 1947 (balg bewaard in het KBIN) en twee ringterugmeldingen (dode vogel te Sauvenière, Namen in 1963 en een hoogspanningsslachtoffer te Roeselare in 2000 – beide als pullus geringd in het noorden van Zweden).

Toendraslechtsvalk *Falco peregrinus calidus*

Deze ondersoort staat (nog) niet op de Belgische lijst, maar werd wel al enkele malen gemeld. Momenteel hebben wij echter geen weet van kenmerken die het mogelijk maken om deze ondersoort bij ons met zekerheid te herkennen in het veld. Niet iedere grote, bleke Slechtsvalk is een *calidus*. Het is zelfs niet gezegd dat het in dergelijke gevallen steeds om zuivere Slechtsvalken gaat, aangezien er nogal wat valkeniershybriden en terugkruisingen rondvliegen.

Voor aanvaarding van deze ondersoort op de Belgische lijst zijn minstens uitgebreide biometrische gegevens nodig (dus enkel vangsten of vondsten komen in aanmerking), maar liefst nog een ring aan de poot ook.

Giervalk/Sakervalk/Lannervalk *Falco rusticolus/cherrug/biarmicus*

Valkeniershybriden en terugkruisingen maken herkenning van deze soorten in het veld bijzonder moeilijk. De documentatie moet dan ook zo gedetailleerd mogelijk zijn, met naast een uitgebreide beschrijving ook een reeks goede foto's.

Baltische (Mantel)meeuw *Larus fuscus fuscus*

Enkel ge(kleur)ringde vogels, geringd als nestjong in de broedgebieden worden beoordeeld. Deze ondersoort staat nog niet op de Belgische lijst, maar werd in het verleden al af en toe gemeld. Steeds ging het om niet-geringde exemplaren.

Mogelijk zijn sommige eerste en zelfs tweede zomer *fuscus* met zekerheid herkenbaar in het veld (cf. Winters 2006), maar dat is iets wat meer studies met gekleurde vogels moeten uitwijzen. Foto's van zulke 1ste en 2de zomer vogels 'met kenmerken van *fuscus*' zijn steeds welkom, maar zullen pas later worden beoordeeld.

Noordelijke Alk *Alca torda torda*

Enkel vondsten en gevangen vogels komen in aanmerking voor beoordeling. De vleugellengte is het belangrijkste kenmerk, in combinatie met het aantal witte en zwarte groeven op de snavel (De Smet *in litt.*). Bij immature vogels is ook de snavelhoogte t.h.v. de gons van belang. Er zijn momenteel 8 aanvaarde Belgische gevallen (allemaal vondsten), die echter herzien zouden moeten worden.

Mongoolse Pieper *Anthus godlewskii*

Omdat de roep veruit het beste kenmerk van de soort is, zal bij veldwaarnemingen meestal een geluidsopname nodig zijn. Bij vogels die al enkele middelste dekveren van het adulte type hebben of vogels die in volledig adult kleeft zijn, kan een gedetailleerde beschrijving wel al volstaan, liefst met goede foto's erbij. Dit laatste geldt uiteraard ook voor ringvangsten.

Balkan (Gele) Kwikstaart *Motacilla flava feldegg*

Gele Kwikstaarten met volledig zwarte kop werden tot niet zo lang geleden steeds aanvaard als Balkan (Gele) Kwikstaart, met als argument dat een dergelijk kopt patroon nooit zou voorkomen bij Noordse (Gele) Kwikstaart *Motacilla flava thunbergi*, noch bij tussenvormen. Die mening moest echter bijgesteld worden in 2003, enerzijds door de vogel van Koningshooikt (die sterk leek op Balkan (Gele) Kwikstaart en enkel verschilde door de roep en groene vlekjes op de borst; zie De Smet et al 2005; p. 39) en anderzijds door de publicatie van 'Pipits & Wagtails' (Alström & Mild 2003), met daarin de informatie dat Noordse (Gele) Kwikstaart toch ook een volledig (mat)zwarte kop kan hebben. Ook in Engeland werd een mannetje "Balkan (Gele) Kwikstaart" gemeld dat achteraf niet aanvaardbaar bleek, hoewel de vogel uitgebreid bekeken en gedocumenteerd was (Rowlands 2003).

Om deze redenen wordt de lat nu hoger gelegd, in die zin dat niet enkel minimum een volledige beschrijving van de vogel zelf maar ook van de roep gevraagd wordt.

De drie Belgische gevallen van deze ondersoort werden ondertussen ook herzien en één daarvan is niet langer aanvaardbaar (zie verder in dit rapport).

We willen er verder nog op wijzen dat zowel mannetjes als vrouwtjes Balkan (Gele) Kwikstaart in het veld herkenbaar kunnen zijn; ook beschrijvingen van vrouwtjes zijn dus welkom.

Iberische (Gele) Kwikstaart *Motacilla flava iberiae*

Deze ondersoort staat nog niet op de Belgische lijst, maar werd al verschillende malen gemeld. Het is erg moeilijk om zulke vogels 'hard' te maken; er moet rekening worden gehouden met allerlei tussenvormen *iberiae X flava*, *iberiae X cinereocapilla*, *flava X cinereocapilla*, *flava X thunbergi* en ook *flava X feldegg* en met het feit dat mannetjes *flava* en *thunbergi* een volledig witte keel kunnen hebben. Voor aanvaarding zullen dan ook goede foto's nodig zijn, samen met een beschrijving van de roep of een geluidsopname.

Om precies dezelfde redenen zullen ook gevallen van Italiaanse (Gele) Kwikstaart *M. f. cinereocapilla* even streng worden beoordeeld. Ook deze ondersoort staat nog niet op de Belgische lijst, maar werd wel recent aanvaard in Nederland (www.dutchbirding.nl).

Oostelijke Zwarte Roodstaart *Phoenicurus ochruros ochruros/phoenicuroides*

Een waarneming van een eerste winter Oostelijke Zwarte Roodstaart te Zeebrugge op 28 oktober 1993 werd indertijd aanvaard door het BAHC (De Smet & Vercruyse 1994; De Smet et al 1995) maar later door de ontdekker terug ingetrokken omdat het probleem van hybriden Zwarte X Gekraagde Roodstaart *P. o. gibraltariensis X P. phoenicurus* toen nog onderschat werd.

Omdat dergelijke hybriden sterk kunnen lijken op Oostelijke Zwarte Roodstaart, zullen goede foto's nodig zijn, die o.a. de vleugelpunten duidelijk tonen. Bij ringvangsten is het aan te raden enkele veertjes te bewaren voor mogelijk DNA-onderzoek.

Voor de verschillen tussen deze ondersoort en hybriden verwijzen we naar Steijn (2005).

IJslandse Koperwiek *Turdus iliacus coburni*

Enkel ringvangsten komen in aanmerking, omdat biometrische gegevens nodig zijn. Enkel typische exemplaren kunnen aanvaard worden, omdat er veel overlap is in verenkleed en vleugellengte tussen *coburni* en *iliacus*. Als documentatie worden een uitgebreide beschrijving en biometrie (vooral vleugel-, staart-, snavel- en tarsuslengte) gevraagd.

Iberische Tjiftjaf *Phylloscopus ibericus*

Aangezien het geluid (zang en roep) het belangrijkste kenmerk vormt, wordt een geluidsopname gevraagd voor beoordeling, naast een beschrijving. De geluidsopname moet zo lang mogelijk zijn, om te kunnen horen of het gaat om een exemplaar dat constant als Iberische Tjiftjaf zingt, om een mengzanger (een Iberische Tjiftjaf die bij momenten de zang van gewone Tjiftjaf *Phylloscopus collybita* imiteert) of een hybride.

We willen erop wijzen dat het ook nuttig kan zijn om te letten op het gedrag; zo laten nogal wat Iberische Tjiftjaffen hun staart trillen op het einde van hun zang, in tegenstelling tot gewone Tjiftjaf (Slaterus 2007). Voor ringvangsten is geen geluidsopname nodig, maar wel de vleugel formule.

Siberische Tjiftjaf *Phylloscopus collybita tristis*

Beoordeling van deze ondersoort is steeds problematisch geweest, omdat er nog veel onduidelijkheid is over de herkenning en de verspreiding ervan en omdat de in de literatuur genoemde kenmerken vaak erg subtiel en soms zelfs tegenstrijdig zijn. Het ontbreken van gele en groene tinten in bepaalde delen van het verenkleed is lastig vast te stellen in het veld en op foto's, o.a. omdat belichting een belangrijke rol speelt.

Het BAHC heeft tot nu toe enkel fotografisch gedocumenteerde ringvangsten onderzocht, hoewel in principe ook veldwaarnemingen in aanmerking kwamen als er een geluidsopname was gemaakt van de zang (niet de roep).

Het ontbreken van gele en groene tinten in het grootste deel van het overigens grijze of bruine verenkleed werd als belangrijkste criterium gebruikt, in combinatie met de vleugelformule en/of roep, maar een recent artikel verfijnt deze criteria en stelt dat zeer grijze Tjiftjaffen niet noodzakelijk tot de ondersoort *tristis* behoren, integendeel (zie Dean & Svensson 2005).

Volgens de huidige kennis heeft een 'goede' *tristis* nogal bruine boven delen, een warmbruine tint op de flanken en oorstreek, geen geel in het verenkleed behalve aan de vleugelboeg en oksels, geen groene tinten behalve op de randen van de slag- en staartpennen, een nogal korte, zwarte snavel en een klagende, éénlettergreppige 'iep'-roep, die herinnert aan een kuiken.

Er is echter nog veel onduidelijkheid over de variatie bij *tristis* en (oostelijke) *abietinus* en over de vorm '*fulvescens*' (tussenvorm *abietinus X tristis*? een variant van *tristis*? een aparte ondersoort?) en hoe die er juist uitziet. Bovendien is al meermaals gebleken dat foto's lang niet altijd bepaalde subtiele kleurtinten zoals bruin, lichtgeel en olijfgroen, correct weergeven, waardoor beoordeling achteraf sterk bemoeilijkt of compleet onmogelijk wordt.

Om die redenen zal het BAHC gedocumenteerde ringvangsten van mogelijke 'goede' *tristis* voorlopig enkel verzamelen en er nog geen uitspraak over doen. Bleke, zeer grijs met witte Tjiftjaffen worden echter voorlopig als waarschijnlijke (oostelijke) *abietinus* beschouwd, niet *tristis*, zelfs als de roep klopt voor een 'goede' *tristis*.

Grote Kruisbek *Loxia pytyopsittacus*

Voor een zekere determinatie wordt aanbevolen om, naast een gedetailleerde beschrijving, ook foto's en/of geluidsopnamen in te dienen. Herkenning van Grote Kruisbek is zowel op zicht als op geluid lastig, omdat er veel variatie is bij gewone Kruisbek *Loxia curvirostra*. Bepaalde types gewone Kruisbek hebben een zwaardere, diepere snavel dan andere en hebben bovendien ook een dieper klinkende roep, die sterk lijkt op de roep van Grote Kruisbek (cf. Fouarge 2005; www.dickforsman.com). Dergelijke types zouden vooral in dennen *Pinus* foerageren (zoals Grote Kruisbek), terwijl Kruisbekken met fijnere snavel vooral sparren *Picea* verkiezen.

Opstellen en indienen van verslagen

Hoewel veel waarnemers positief reageerden op onze gerichte vragen om documentatie, werd toch nog een groot deel van de in 2005 waargenomen zeldzame soorten (nog) niet ingediend. In sommige gevallen is dit omdat de waarnemer niet zo grondig vertrouwd is met topografie of terminologie die gebruikt wordt in beschrijvingen en daardoor opziet tegen het opstellen van een verslag. Het BAHC is steeds bereid om in dat geval te helpen. Kladvorsies van verslagen kunnen opgestuurd worden naar Miguel Demeulemeester (miguel.demeulemeester@telenet.be), die ervoor zorgt dat de tekst van commentaar wordt voorzien en teruggestuurd naar de waarnemer, waarna hij die kan indienen.

Wie een verslag heeft ingediend, krijgt zo snel mogelijk via e-mail of post bericht of de beschrijving al dan niet aanvaard werd. Wie meer uitleg wil over de beslissing van het BAHC, kan dit simpelweg vragen aan de afzender.

Dank

Het BAHC dankt eerst en vooral *Natuurpunt* vzw. voor de betaling van de werkings- en publicatiekosten van het BAHC. Verder kunnen wij opnieuw dankzij een goede samenwerking met de *Commission d'Homologation* (CH) een rapport over heel België aanbieden. De taal van de waarnemer bepaalt door welk homologatiecomité een waarnemingsformulier beoordeeld wordt. BAHC en CH zijn ervan overtuigd dat een zinvolle interpretatie van het voorkomen van zeldzame soorten alleen mogelijk is in een ruimere context. Bovendien is er behoefte aan wetenschappelijke samenwerking en nationale publicaties, wil men op internationaal vlak nog meetellen.

Volgende BAHC-leden beoordeelden de gevallen die in dit rapport zijn opgenomen:

Peter Adriaens (voorzitter)
Patrick Beirens
Miguel Demeulemeester
Gunter De Smet
Joris Elst
Tom Goossens
Geert Spanoghe

GEBUIK VAN DE SYSTEMATISCHE LIJST

Dit rapport volgt de indeling verklaard in *Oriolus* 61:25-39.

Tekens en afkortingen/ *Signs and abbreviations*

Tijdschriften/ *Magazines*

BBM: *Belgian Birding Magazine* Dutch B.: *Dutch Birding*
Bird.World: *Birding World* (N.) Oriol.: (*Natuur.*) oriolus
Brit.Birds: *British Birds* Wiel.: *Wielewaal*

10 Provincies/10 Provinces

(A)	Antwerpen	(Lx)	Luxembourg
(BW)	Brabant Wallon	(N)	Namur
(H)	Hainaut	(O)	Oost-Vlaanderen
(L)	Limburg	(VB)	Vlaams Brabant
(Lg)	Liège	(W)	West-Vlaanderen

Geslacht, Leeftijd & Kleed/*Sex, Age & Plumage*

m.	manneltje/ <i>male</i>
v.	vrouwetje/ <i>female</i>
1e kj	eerste kalenderjaar/ <i>first calendar year</i>
1e kj+	eerste kalenderjaar OF ouder/ <i>first calendar year OR older</i>
ad.	adult
juv.	juveniel/ <i>juvenile</i>

Trekrichtingen worden aangeduid met universele afkortingen : N = noord, NE = noordoost, NNE enz./*migrating birds are marked as N = North, NE = North East, NNE etc.*

(f) fotografisch gedocumenteerd. Naam van de fotograaf. Foto gepubliceerd, met referentie, of duplicaat in BAHC-archief/*photographed + reference.*

(b) bandopname in BAHC-archief/*tape-recorded*

(dit bewijsmateriaal werd gezien/gehoord door het BAHC, een dubbel berust in het BAHC-archief/*this evidence seen/heard and filed by the committee*)

(Deel)gemeentenamen dienen geïndexeerd te zijn op de meest recente overzichtskaart van administratief België (NGI, 1995), en worden cursief gedrukt. Plaatsnamen in Vlaanderen en in tweetalige gemeenten zijn in het Nederlands. Plaatsnamen in Wallonië zijn in het Frans.

Names of municipalities must be indexed on the most recent municipality map (NGI, 1995). Names of municipalities in Flanders and bilingual municipalities are in Dutch. Walloon municipalities are in French.

Telling van de gevallen

Volgens *Voorlopige lijst van Belgische vogels* (mond. med. De Smet G.). Deze lijst vermeldt alle gehomologeerde gevallen in België. Enkel gevallen waarvan de datum tot op de maand precies en de plaats tot op de provincie precies bekend is, worden meegeteld. Drie gegevens volgen de soortnaam:

1. exemplaren in de periode 1800-1949
2. exemplaren in de periode 1950-2004
3. exemplaren in 2005

Een cijfer tussen haakjes voor een bepaald geval geeft aan het hoeveelste exemplaar dit bepaalde geval is sinds het begin van de telling.

Count

Based on *Preliminary List of Belgian Birds* (DE SMET, unpublished), an annotated checklist of all accepted records in Belgium. Only records with sufficient trustworthy information on date (at least up to the month) or location (at least up to the province) are included. Three figures are given :

1. individuals in 1800-1949
2. individuals in 1950-2004
3. individuals in 2005

The number in parentheses preceding a record refers to the total number of individuals recorded in Belgium since the start of the count.

SYSTEMATISCHE LIJST

1. Aanvaarde gevallen

Ringsnaveleend *Aythya collaris* (0, 14, 1)

(15) 1 januari-15 januari: Hamput Waasmunster (O), 1 m. (Joris Everaert; verslag Simon Feys)

Blauwvleugeltaling *Anas discors* (0, 14, 1)

(15) 30 april: Het Vinne Zoutleeuw (VB), 1 m. (Joachim Mergeay)



Ralreiger *Ardeola ralloides*. 25 juni 2005, Kruibeke.
(Foto : Bart Heirweg)

Amerikaanse Wintertaling *Anas carolinensis* (0, 16, 2)
(17) 15 januari-7 maart: Destelbergen (O), 1 m. (Michael Moors; verslag Simon Feys)
(18) 13 maart: Hoge Noen Dudzele (W), 1 m. (Verslag Patrick Beirens)

Stormvogeltje *Hydrobates pelagicus* (5, 66, 1)
(72) 16 november: Oostende (W), 1 ex. (Hilbran Verstraete)

Ralreiger *Ardeola ralloides* (4, 24, 1)
(29) 25 juni: Kruibeekse Polder (O), 1 ad. zomer (Henri Felix)

Zwarte Ibis *Plegadis falcinellus* (72, 27, 2)
(100) 10 juli-28 juli: Dudzele/Uitkerke (W), 1 ex. (Laurent Raty; Verslag Gerald Driessens; foto Patrick Beirens, Nathalie Annoye)
(101) 5 november-7 november Kallo (O), 1 ex. (Geert Van den Heuvel; Verslag Patrick Beirens; foto Patrick Beirens en Vincent Legrand)

De vogel van 10 juli was voor sommige mensen een langverwachte nieuwe soort. Op 19 juni was er ook al een melding te Dudzele-Zeebrugge (Achterhaven), maar die werd (nog) niet ingediend. De vorige aanvaarde Zwarte Ibis in België dateren van 1998.

Zeearend *Haliaeetus albicilla* (31, 73, 0)
ADDENDUM
(102) 22- minstens 25 februari 2003, Sint-Agatha-Rode (VB), 1 immatuur (verslag Simon Feys)

Grijze Wouw *Elanus caeruleus caeruleus* (0, 1, 2)
(2) 29 maart-30 maart: Le Plantain, Thoricourt (H), 1 ex. (De Crem J; Verslag De Crem J (CH), Verslag Miguel Demeulemeester, Verslag Gerald Driessens)
(3) 21 april: Mechels Broek, Mechelen (A), 1 ex. (Regis Nossent)
Een waarneming op 19 mei te Knokke werd (nog) niet ingediend.

Slangenarend *Circaetus gallicus gallicus* (4, 28, 3)
(33) 13 mei: Mechels Broek, Mechelen (A), 1 ex. (Ken Lossy)
(34) 15 mei: Grandes Carrières, Vaucelles (N), 1 ex. (Vanhove F. CH)
(35) 3 juni: Kalmthout (A), 1 ex. (Glenn Vermeersch; [f.])
ADDENDUM
(30) 18-19 juli 2003 Groot Schietveld, Brecht (A), 1 ex. (verslag Simon Feys)

Steppekiekendief *Circus macrourus* (13, 10, 4)
(24) 2 april: Van Gheyte, Hensies (H), 1 ad. m. (Jénard P. CH)
(25) 1 mei: Zwin, Knokke (W), 1ste zomer m. (Miguel Demeulemeester, Geert Spanoghe)
(26) 9 juli: Groot Schietveld, Brecht (A), 3e kj m. ["first-adult male"] (Jef De Ridder & Guido Bulteel)



Grijze Wouw *Elanus caeruleus*. 30 maart 2005, Thoricourt.
(Foto : Diederik D'Hert)

(27) 2 augustus: Velaine-sur-Sambre (N), 1 m. (Fripiat J-P CH)
ERRATUM

(23) 1 - 4 november 2004: Thuillies (H), 1 juv. (Hanus B.; verslag Ameels M.; CH; verslag Driessens G.; f Buckens J. Dutch B. 27/1(2005):78, pl. 95; Ameels M. en Hanus B. arch. CH)
In het vorige rapport stond verkeerdelijk 8 november als laatste datum vermeld.

Met vier aanvaarde waarnemingen was 2005 het beste jaar ooit voor deze soort. Nog eens vier gevallen werden (nog) niet ingediend. Ook in de ons omringende landen lijkt het aantal waarnemingen toe te nemen.

Ruigpootbuizerd *Buteo lagopus*

- 4 maart: Gages (H), 1 ex. (Schollaert V. CH)
- 6 maart: Groot Schietveld Brecht (A), 1 juv. (Joris Elst)
- 17 oktober: De Maten Diepenbeek (L), 1 ad. (Geert Beckers)
- 28 oktober: Plateau Outgaarden (VB), 1 ex. (Freek Verdonck)
- 1 november: Rotem (L), 1 juv. (Geert Beckers)
- 27 november: Hoboken (A), 1 ex. (Bart De Keersmaecker)
- 10 december: Verrebroekse Plassen Verrebroek (O), 1 juv. (Joris Everaert)

Elf waarnemingen werden (nog) niet ingediend en drie werden niet aanvaard. In totaal werden in 2005 dus 21 Ruigpootbuizerds gemeld! Om een correct beeld te krijgen van de huidige status van deze soort in België, verzoeken we de waarnemers om elk geval te documenteren. Verwarring met gewone Buizerd *Buteo buteo* wordt soms nog onderschat en zorgt er wellicht voor dat een te optimistisch beeld wordt gevormd van het voorkomen bij ons. Met 21 exemplaren zou de soort talrijker geweest zijn dan b.v. Kuifduiker *Podiceps auritus* in 2005.

Kleine Torenvalk *Falco naumanni* (0, 0, 0)

De vangst van een juveniele vogel op 18 oktober 1964 te Retie werd herzien en is niet langer aanvaardbaar. Er zijn geen foto's van deze vogel. De beschrijving is zeer beknopt en vermeldt enkel lichte klauwen en dat de vogel er, na het loslaten, in vlucht "zelfs met het blote oog duidelijk anders uitzag dan gewone Torenvalk". Het eerste past ook nog op Roodpootvalk *Falco vespertinus*; het tweede is eigenaardig voor Kleine Torenvalk, aangezien juveniele vogels juist bijzonder goed lijken op gewone Torenvalk *Falco tinnunculus*.

Zelfs als we er rekening mee houden dat oude gevallen niet aan de strenge criteria van nu kunnen onderworpen worden, is dit geval niet meer aanvaardbaar omdat de opmerking dat de vogel zelfs met het blote oog in vlucht duidelijk verschilde van Torenvalk, eerder doet denken aan Roodpootvalk.

Kleine Torenvalk wordt daarmee afgevoerd van de Belgische lijst.

Kleinst Waterhoen *Porzana pusilla* (4, 22, 2)

(27) 3 juni: Het Vinne, Zoutleeuw (VB), 1 roepend ex. (Peter en Erwin Collaerts; verslag Peter Collaerts)

(28) 8 juni-16 juni: Het Wik, Bokrijk (L), 1 roepend ex. (Geert Beckers; [b])

Zowel mannetjes als vrouwtjes zouden een territoriale roep hebben; die verschilt tussen beide geslachten maar de verschillen werden nog niet gepubliceerd (zie van der Vliet et al 2006). Voorlopig worden de gevallen daarom gepubliceerd zonder vermelding van geslacht.

Griël *Burhinus oedicnemus* (9, 41, 3)

(51) 31 maart: steengroeve Amay (Lg), 1 ex. (Loly P.; CH)

(52) 2 mei: Antoing (H), 1 ex. (Derume M.; CH)

(53) 1 juli: Antwerpen Linkeroever (O), 1 ex. (Geert De Smet; foto Geert Spanoghe)

Steppiekievit *Vanellus gregarius* (0, 7, 1)

(8) 22 september: Bezinkingsputten, Longchamps (N), 1 ad. winter (Philippe Vanmeerbeecke; [f.] CH)

Dit is reeds de tweede waarneming voor Longchamps; de vorige was in maart 2004.

Bonapartes Strandloper *Calidris fuscicollis* (0, 4, 2)

(5) 29-30 juli: Puttenplas, Kieldrecht (O), 1 ad. (Geert Spanoghe; verslag Gerald Driessens; Foto Kris Dekeersmaecker)

(6) 7-10 oktober: Tienen (A), 1 juv. in rui naar 1ste winter (verslag Peter Collaerts; verslag Gerald Driessens)

De vogel van Tienen was het eerste juveniele exemplaar voor België.

Gestreepte Strandloper *Calidris melanotos* (0, 49, 6)

(50) 11 mei: Uitkerke camping (W), 1 ex. (Steven Vantieghe)

(51) 15 mei-17 mei: Gentbrugge (O), 1 ex. (Michael Moors; verslag Simon Feys)

(52) 28 juli-31 juli: Bezinkingsputten, Hologne-sur-Geer (Lg), 1 ad. (Sébastien Leunen, [f.]; f. Charly Farinelle; CH)

(53) 15 augustus: Wintam (A), 1 ad. (Foto Kris Dekeersmaecker)

(54) 28-29 augustus: Grote Zandput, Mol (A), 1 ex. (Verslag Eli Van Audenhove)

(55) 5-12 september: Wintam (A), 1 juv. (Foto Kris Dekeersmaecker)

Poelsnip *Gallinago media* (68, 66, 2)

(135) 11 september: Ethylvlakte, Desteldonk, Gent (O), 1 ex. (Davy Bosman)

(136) 20-21 september: Zeebrugge achterhaven (W), 1 ex. (Hilbran Verstraete; f. Johan Buckens)

September is de beste maand om deze soort bij ons te zoeken.



Terekruiter *Xenus cinereus*. 25 mei 2005, Kieldrecht.
(Foto: Patrick Beirens)

Grote Grijs Snip *Limnodromus scolopaceus* (0, 2, 0)

De waarneming van een langsvliegende, gefotografeerde vogel in winterkleed te Stuivekenskerke (W) op 10 december is nog in behandeling bij de CH.

Poelruiter *Tringa stagnatilis* (4, 176, 3)

(181) 21-23 april: Longchamps (N), 1 ex. (Didier Vieuxtemps; [f.]; CH)

(182) 27 april: Uitkerke camping (W), 1 ex. (foto Johan Buckens)

(183) 15 mei: Hoge Noen, Zeebrugge (W), 1 ex. (Gunther Vergauwen; Verslag Simon Feys)

Terekruiter *Xenus cinereus* (0, 15, 1)

(16) 24-27 mei: Kieldrecht (O), 1 ex. (Geert Spanoghe; Verslag Gerald Driessens; foto Patrick Beirens)

Grauwe Franjepoot *Phalaropus lobatus*

- 18-21 augustus: Het Zoete Water, Oud-Heverlee (VB), 1 juv. (André Verboven [f.])

- 30 augustus: Viconiakleiputten, Stuivekenskerke (W), 1 juv. in rui naar 1ste winterkleed (Johan Buckens [f.])

Deze soort is op de homologatielijst geplaatst sinds 1 januari 2005.

Reuzenzwartkopmeeuw *Larus ichtyaetus* (1, 1, 1)

(3) 28 mei 2005: Assenede (O), 2de zomer naar NE (Luc Bekaert) Sinds Luc met de fiets naar het werk gaat, maken we wat mee in België...

Ringsnavelmeeuw *Larus delawarensis* (0, 16, 1)

(17) 28 maart: Bourgoyen, Gent (O), 1 ad. (Geert Spanoghe)

Kleine Burgemeester *Larus glaucoides* (2, 30, 1)

(33) 17-18 december: strand De Panne en strand Oostduinkerke (W), 1 juv. (Ken Lossy e.a.; f. Diederik D'Hert & Johan Buckens)

Lachstern *Gelochelidon nilotica* (19, 109, 1)

(129) 23 april: Het Zwin, Knokke (W), 1 ad. zomer (Verslag Patrick Beirens)

ADDENDUM

(122-123) 3 en 10 augustus 2000, Het Zwin, Knokke (W), respectievelijk 1 en 2 ad. zomer pleisterend (Simon Feys)

Reuzenster *Sterna caspia* (11, 108, 3)

(120) 22 april: Het Zwin, Knokke-Heist (W), 1 ex. naar NE (Verslag Steven Vantieghe)

(121) 24 april: De Panne & Middelkerke (W), 1 ex. naar NE (Tom Goossens; Johan Buckens; Miel Ferdinande; [f.])



Witvleugelstern *Chlidonias leucopterus*. 13 mei 2005, Nieuwpoort.
(Foto : Johan Buckens)



Witvleugelstern- twitch 13 mei 2005, Nieuwpoort.
(Foto: Johan Buckens)

(122) 31 augustus: Het Zwin, Knokke-Heist (W), 1 ex. (Jorg Lambrechts)

De vogel van De Panne werd later onderschept en gefotografeerd te Middelkerke en zou ook gezien zijn te Mariakerke en Oostende.

Witvleugelstern *Chlidonias leucopterus* (6, 193, 5)

(200) 12 mei: De Gavers, Harelbeke (W), 2e zomer (John Dekijvere; verslag Miguel Demeulemeester)

(201) 13 mei: Sint Joris, Nieuwpoort (W), 2de zomer (Johan Buckens, [f.]; f. Miel Ferdinande)

(202) 15 mei: Wenduine (W), 1 ex. (Stijn Baeten)

(203) 3 juli: Viconiakleiputten Stuivekenskerke (W), 1 ad. nog groten- deels in zomerkleed (Wim Debruyne; foto Johan Buckens)

(204) 25 augustus: Verrebroekse Plassen, Verrebroek (O), 1 juv. (Björn Deduytsche [f.])

Zwarte Zeekoet *Cephus grylle* (1, 11, 1)

(13) 29 september: De Panne (W), 1 eerstejaars naar SW (Joachim Mergeay; Miguel Demeulemeester)

Papegaaiduiker *Fratercula arctica* (6, 138, 1)

(145) 17 december: De Panne (W), 1ste winter (Wim Heylen; verslag Peter Adriaens)

De vogel zwom lange tijd in de branding en dreef af naar SW.



Witvleugelstern *Chlidonias leucopterus*. 3 juli 2005, Stuivekenskerke.
(Foto: Koen Verbanck)

Alpengierzwaluw *Apus melba* (2, 24, 1)

(27) 30 april: Knokke (W), 1 ex. naar NE (Gunther Vergauwen & Patrick Beirens)

Deze vogel werd eerder opgemerkt te Bredene (W), maar die waarne- ming werd (nog) niet ingediend.

Kortteenleeuwerik *Calandrella brachydactyla* (12, 22, 1)

(35) 10 juni: Kalmthoutse Heide, Kalmthout (A), 1 ex. (De Groof Chris; [f.])

Dit is nog maar de tweede juni-waarneming voor België.

Rotszwaluw *Ptyonoprogne rupestris* (0, 2, 1)

(3) 4-6 november: Mechelen (A), 1 ex. (Pieter Vantieghem; Verslag Gerald Driessens; foto Patrick Beirens en Johan Buckens)

De vogel werd ontdekt tijdens de dagelijkse ochtendwandeling van het station naar het werk, in het midden van de stad Mechelen.

Het vorige geval dateerde alweer van 1994.

Roodstuitzwaluw *Hirundo daurica* (0, 13, 3)

(14-15) 7 april: Gavers, Harelbeke (W), 2 ex. (Robrecht Pillen; Verslag Miguel Demeulemeester)

(16) 1 mei: Fonteintjes, Blankenberge (W), 1ex. naar NE (Paul D'Hoore)

ADDENDUM

(9) 26 april 2004: Spanjaardduinen, Bredene (W), 1 ex. naar NE (Ronan Felix)



Rotszwaluw *Ptyonoprogne rupestris*. 4 november 2005, Mechelen.
(Foto : Johan Buckens)



Mongoolse Pieper *Anthus godlewskii*. 21 november 2005, Oostende.
(Foto : Johan Buckens)



Izabeltapuit *Oenanthe isabellina*. 21 oktober 2005, Aarschot.
(Foto : Bart Heirweg)

De laatste jaren nemen de waarnemingen van deze soort sterk toe in België (en Nederland). Tot 2004 kwam Roodstuitzwaluw niet-jaarlijks bij ons voor, maar van dan af zijn er ieder jaar meerdere waarnemingen (5 aanvaarde exemplaren in 2004, 3 in 2005 en 5 in 2006).

Mongoolse Pieper *Anthus godlewskii* (0, 3, 2)

(4) 6 november-30 december: Oostende (W), 1ste winter, later ook gevangen en geringd (Jurgen Dewolf; Peter Adriaens, Ward Vercruysse; verslag Gerald Driessens; verslag Norbert Roothaert [ringverslag]; f. Patrick Beirens, Roland François, Johan Buckens e.a.; [b.] Ward Vercruysse en Peter Adriaens; *Natuur.oriolus* 72:4; 127-131)

(5) 10 november-21 januari 2006: Vennengebied Turnhout (A), 1 ex. (Marc Smets; verslag Gerald Driessens; [b.] Billy)

ADDENDUM

(3) 26 oktober 2004 Grembergen (O), 1ste winter gevangen en geringd (Jozef Mannaert; [f.]

Zie verslag

Balkankwikstaart *Motacilla flava feldegg* (0, 2, 0)

Omdat de criteria voor herkenning en aanvaarding van deze ondersoort de laatste jaren strenger zijn geworden (zie inleiding van dit rapport), werden alle Belgische gevallen (3) herzien. Eén van de drie is niet meer aanvaardbaar, namelijk een mannetje op 12-13 mei 1997, Kluizen (O). Deze vogel riep niet en had een groene vlek in het midden van de borst. De roep is een belangrijk kenmerk en is nodig om de determinatie hard te maken. Groene vlekken op de borst komen nauwelijks voor bij Balkankwikstaart maar zijn wel normaal bij Noordse *Motacilla flava thunbergi*, wat dus kan wijzen op een tussenform.

Noordse Nachtegaal *Luscinia luscinia* (0, 28, 1)

(29) 19 augustus: Doornpanne, Koksijde (W), 1ste winter gevangen en geringd (Diederik D'Hert)

Van de 29 aanvaarde gevallen tot nu toe zijn er 20 in de maand augustus.

Blauwstaart *Tarsiger cyanurus* (0, 1, 1)

(2) 15 oktober: Voorhaven Zeebrugge (W), 1 ex. (Peter Adriaens; Filip T'Jollyn; foto Koen Verbanck)

De vogel werd slechts korte tijd en door maar een handvol waarnemers gezien. Het vorige Belgische geval dateert van 2001.



Izabeltapuit *Oenanthe isabellina*. 21 oktober 2005, Aarschot.
(Foto : Johan Buckens)

Izabeltapuit *Oenanthe isabellina* (0, 1, 1)

(2) 18-22 oktober: stationsparking Aarschot (VB), 1ste winter (Marc Herremans; verslag Gerald Driessens; f. Patrick Beirens, Tom Goossens e.v.a.) Zie *Natuur.oriolus* 71(4): 109-113

Het vorige Belgische geval dateert van 2003.

Veldrietzanger *Acrocephalus agricola* (0, 23, 0)

ERRATUM

(22) 3 september 2004: Wijchmaal (L): 1 ex. gevangen en geringd (Van Endert A.; ringnummer 9065338)

In het vorige rapport stond verkeerdelijk Wijchmaal (VB) vermeld.

Vale Spotvogel spec. *Hippolais elaiica/opaca* (0, 0, 0)

Een ringvangst op 22 september te Ingooigem (W) is nog in behandeling bij de CH.

Baardgrasmus *Sylvia cantillans* (0, 15, 2)

(16) 25 mei: Verrebroek, Kieldrecht (O), 1ste zomer m., ondersoort *albistriata* (Geert Spanoghe; foto Johan Buckens)

(17) 27 mei: Wenduine (W), 1 m., ondersoort *cantillans/inornata* (Steven Vantieghe; foto Miel Ferdinande; [b] Peter Adriaens)

De meeste Belgische waarnemingen hebben betrekking op mannetjes.

Kleine Zwartkop *Sylvia melanocephala* (0, 5, 1)

(6) 23 april: Ambly-Nassogne (Lx), 1 ad. m. (Walter Belis)



Baardgrasmus *Sylvia cantillans*. 25 mei 2005, Kieldrecht.
(Foto : Johan Buckens)

Pallas' Boszanger *Phylloscopus proregulus* (0, 91, 1)

(92) 31 oktober: Broek Denayer, Willebroek (A), 1 ex. gevangen en geringd (Alfons Willemsen)

ADDENDA

- (78) 6 november 2003: Oostende (W), 1 ex. (verslag Simon Feys)
 (82) 21 oktober 2004: Zulte (O), 1 ex. gevangen en geringd (Daniel Packet e.a.; ringnummer SV8091)
 (86) 27 oktober 2004: Machelen, Deinze (O), 1 ex. gevangen en geringd (Myrando Vandenbulcke e.a.; ringnummer SS3572)
 (87) 30 oktober 2004: Korbeek-Lo (VB), 1 ex. gevangen en geringd (Johan Vanautgaerden)
 (88) 30 oktober 2004: Heist (W), 1 ex. (foto Koen Verbanck)
 (89) 1 november 2004: Nordic, Blankenberge (W), 1 ex. (Hans Matheve; verslag Simon Feys)

Raddes Boszanger *Phylloscopus schwarzi* (0, 17, 3)

- (18) 7 oktober: Kinrooi (L), 1 ex. gevangen en geringd (Guido Knoops e.a.; [f.])
 (19) 7-8 oktober: Huldenberg (VB), 1 ex. (Frederik Fluyt; Verslag Gerald Driessens; [f.])
 (20) 11 oktober: Heurne (O), 1 ex. gevangen en geringd (Luc Menschaert; [f.])

Bruine Boszanger *Phylloscopus fuscatus* (0, 30, 2)

- (31) 16 oktober: Haag, Heist (W), 1 ex. (foto Patrick Beirens)
 (32) 12-14 november: Stapelterrein Heist (W), 1 ex. (Hilbran Verstraete; Verslag Gerald Driessens)
 ADDENDA
 (26) 22 oktober 2003: Oud-Turnhout (A), 1 ex. gevangen en geringd (Jef Geudens; [f.])
 (27) 25 november 2003: Voorhaven, Zeebrugge (W), 1 ex. (verslag Simon Feys)
 (29) 19 oktober 2004: Wenduine (W), 1 ex. (Gunther Vergauwen e.a.)

Iberische Tjiftjaf *Phylloscopus ibericus* (0, 2, 1)

- (3) 17-27 april: Helleketelbos, Poperinge (W), 1 zingend m. (Olivier Dochy; verslag Miguel Demeulemeester; [b.] Pieter Vantieghem)
 Net zoals in Nederland en Engeland vragen we om waarnemingen van deze soort te documenteren met een geluidsoptname.

Kleine Vliegenvanger *Ficedula parva* (0, 83, 1)

- (84) 15-17 oktober: station Zeebrugge (W), 1ste winter (Hans Matheve; verslag Gerald Driessens; foto Patrick Beirens)
 ADDENDUM
 (79) 1 oktober 2002: Marinebasis, Zeebrugge (W), 1ste winter (verslag Simon Feys)



Bruine Boszanger *Phylloscopus fuscatus*.
16 oktober 2005, Heist. (Foto : Patrick Beirens)

Roodkopklauwier *Lanius senator* (?; 129, 3)

- (130) 1 mei: Raversijde (W), 1 v. (foto Patrick Beirens)
 (131) 5 mei: Lummen (L), 1 ex. (foto Bart Heirweg)
 (132) 22 mei: Verrebroek (O), 1 v. (Hildegard Van De Camp, Erik Kaerts)

Roze Spreeuw *Sturnus roseus* (17, 40, 2)

- (58) 6-11 juli: Knokke (W), 1 ad. (Filip Bogaert; foto Patrick Beirens)
 (59) 27 oktober: De Fonteintjes, Zeebrugge (W), 1 ex. naar SW (Paul D'Hoore)

Witstuitbarmsijs *Carduelis homemanni* (1, 21, 1)

- (22) 15 december: Sint-Anna, Hamme (O), 1 ad. v., ondersoort *exilipes* (Marc Hebbelinck)

Witkopgors *Emberiza leucocephalos* (1, 18, 1)

- (20) 28 oktober: Oosthoven, Turnhout (A), 1ste winter m. gevangen en geringd (Jef Leppens; foto Jef Geudens; ringnummer 48V08553)

Grijze Gors *Emberiza cia* (24, 25, 1)

- (50) 21 maart: Ferme Jacob, Willerzie (N), 1 ex. (Xavier Vandevyvre; CH)



Iberische Tjiftjaf *Phylloscopus ibericus*. 18 april 2005, Poperinge.
(Foto : Koen Verbanck)



Kleine Vliegenvanger *Ficedula parva*. 16 oktober 2005, Zeebrugge.
(Foto : Patrick Beirens)

Dwerggors *Emberiza pusilla* (6, 34, 7)

- (41) 1 februari-30 maart: Bourgoyen Gent(O), 1 ex., later gevangen en geringd (Geert Spanoghe ; verslag Gerald Driessens)
- (42) 9-12 maart: Bourgoyen Gent (O), 1 ex. gevangen en geringd (Geert Spanoghe; [f.])
- (43) 21 september: Doornpanne, Koksijde (W), 1ste winter gevangen en geringd (Diederik D'Hert; [f.])
- (44) 6 oktober: voorhaven Zeebrugge (W), 1 ex. (Hilbran Verstraete)
- (45) 7 oktober: Raversijde (W), 1 ex. (Davy De Groot)
- (46) 7 november: Ingooigem (W), 1ste winter gevangen en geringd (Marcel Lauwers e.a.; foto Miguel Demeulemeester; ringnummer 9699715)
- (47) 8 december: Anzegem (W), 1 ex. gevangen en geringd (Martin Van Tieghem)

2. Ontsnapt categorie E**Trompetzwaan *Cygnus buccinator***

11 september 2004, Oude Vrede, Knokke (W), 1 ad. (Hilbran Verstraete)

Deze vogel zat samen met twee Canadese Ganzen *Branta canadensis* en zou ook in de Voorhaven gezien geweest zijn. Trompetzwaan broedt hoofdzakelijk in Alaska en is geen echte lange afstandstrekker. Exemplaren in Europa worden dan ook als ontsnapt beschouwd.

Dwerggans *Anser erythropus*

6 januari, Molsbroek, Lokeren (O), 1 ad. (verslag Simon Feys)
De vogel hield zich op tussen Canadese Ganzen en droeg een kleur-ring.

3. Niet-aanvaarde gevallen**Groenlandse Kolgans *Anser albifrons flavirostris***

5 maart, Houbenhof, Geistingen (L), 1 ex.
Enkel snavelkleur wordt beschreven, maar is niet voldoende om gewone Kolgans of terugkruisingen van bepaalde ganzensoorten uit te sluiten. Voor beoordeling wordt een volledige beschrijving gevraagd, liefst met foto's erbij. Voorlopig worden enkel typische exemplaren aanvaard (zie ook de inleiding van dit rapport).

Ringsnaveleend *Aythya collaris*

13 december, draaikom Ringvaart, Evergem (O), 1 adult m.
Deze vogel pleisterde volgens de waarnemer 's avonds tussen de duikeenden op de draaikom. De plek werd echter toevallig die avond ook bezocht door een BAHC-lid, die zeker is dat er toen geen Ringsnaveleend aanwezig was.

Stormvogeltje *Hydrobates pelagicus*

29 september De Panne (W), 1 ex.
Beschrijving sluit Vaal Stormvogeltje *Oceanodroma leucorhoa* niet uit.

Gon-gon *Pterodroma feae*

16 november, De Panne (W), 1 ex. naar SW.
Hoewel deze waarneming in eerste instantie door het BAHC aanvaard werd (als Gon-gon/Freira), werd na samenspraak met de CH deze beslissing herzien omdat de beschreven manier van vliegen afwijkt van wat normaal is voor de soort. Gon-gon zeilt met hoge bogen, afgewisseld met stijve vleugelslagen; de vlucht verschilt weinig of niet van pijlstormvogels en stormvogels. De beschrijving vermeldt echter een "eerder onhandige vlucht, fladderend en met diepe vleugelslagen; in schril contrast met de (...) lange glijvluchten met stijve vleugels van (pijl)stormvogels – eerder vergelijkbaar met een Torenvalk die zich net gewassen heeft en vervolgens opvliegt."



Roze Spreeuw *Sturnus roseus*. 9 juli 2005, Knokke.
(Foto : Koen Verbanck)

Ruigpootbuizerd *Buteo lagopus*

- 7 februari, Carrière Weywertz (Lg), 1 ex.
Beschrijving sluit bleke Buizerd niet uit.
- 12 november, Kluzendokken, Doornzele (O), 1 ex.
Beschrijving vermeldt een onbevederde tarsus, wat wijst op gewone Buizerd.
- 23 december Verrebroek, 1 ex.
Beschrijving sluit bleke Buizerd niet uit.

Kleine Torenvalk *Falco naumanni*

16 oktober, Gages (H), 1 ad. m.
Aangezien de vogel van Retie onlangs werd herzien en afgekeurd (zie eerder in dit rapport), zou de vogel van Gages een nieuwe soort voor België zijn. In dergelijke gevallen worden de 'Richtlijnen voor de beoordeling van een eerste geval voor België' gevolgd (BAHC 2006). Van de vogel werden geen foto's gemaakt, er waren geen mede waarnemers (er waren wel nog mensen die de vogel zagen, maar dit waren geen actieve vogelkijkers) en de beschrijving was te beknopt.

Klein Waterhoen *Porzana parva*

2 september, étang Latour (Lx), 2 m.
Beschrijving onvolledig.

Glareola species

30 mei, Gaver (O), 1 ex. overvliegend.
Zeer onvolledige beschrijving, die zelfs niet toelaat de vogel te aanvaarden als vorkstaartplevier spec.

Amerikaanse Goudplevier *Pluvialis dominica*

23 augustus, Uitkerkse Polder (W), 1 ex.
Beschrijving onvolledig.

Siberische Strandloper *Calidris acuminata*

23 augustus, Brecht (A), 1 ad. winter
Beschrijving niet gedetailleerd genoeg om b.v. Kempmaan *Philomachus pugnax* uit te sluiten. Bovendien zijn er nauwelijks of

geen waarnemingen van exemplaren in volledig winterkleed in Europa.

Poelsnip *Gallinago media*

- 30 oktober, Grimbergen (VB), 1 ex.

Beschrijving sluit Watersnip *Gallinago gallinago* niet uit.

- 13 september, Evergem (O), 1 ex.

Beschrijving sluit Watersnip niet uit. De (enige) bewijsfoto is te onscherp om er met zekerheid een snip in te herkennen, laat staan Poelsnip.

Poelruiter *Tringa stagnatilis*

4 april, Rotem (L), 1 ex.

Zeer beknopte en onvolledige beschrijving.

Roodstuitwaluw *Hirundo daurica*

21 augustus, Kallo (O), 1 juv.

Beschrijving sluit een hybride Boeren- x Huiswaluw *Hirundo rustica*

X *Delichon urbica* niet uit.

Grote Kruisbek *Loxia pytyopsittacus*

12 maart, Massia, Treignes (N), 2 ex.

Beschrijving sluit gewone Kruisbekken *Loxia curvirostra* niet uit.

BAHC

p/a Vandegehuchte M., Willem de Zwijgerstraat 8,

B-8020 Oostkamp.

tel. 050 827260 (thuis); GSM 0486 393756

E-mail :

voor opmerkingen of vragen :

marnix.vandegehuchte@telenet.be

voor formulieren en algemene informatie :

<http://www.bahc.be/>

Referenties

- ALSTRÖM P. & K. MILD 2003. *Pipits and wagtails*. London.
- BAHC 2006. Lijst van de Belgische vogels; update 2006. <http://www.bahc.be>
- CRAMP S. & K.E.L. SIMMONS (editors) 1988. *The birds of the Western Palearctic*. Oxford.
- DE SMET G., P. ADRIAENS, M. VANDEGEHUCHTE & DE LEDEN VAN HET BAHC 2006. *Lijst van de Belgische vogels (update)*. BAHC.
- DE SMET G., P. ADRIAENS, M. VANDEGEHUCHTE & DE LEDEN VAN HET BAHC 2005. Zeldzame zangvogels in België in 1998-2003. Eenendertigste rapport van het Belgisch Avifaunistisch Homologatiecomité. *Natuur.oriolus*, 71 (2) : 37 - 47.
- DE SMET G. & E. VERCRUYSE 1994. Oostelijke Zwarte Roodstaart *Phoenicurus ochruros* "phoenicuroides" te Zeebrugge (W). *Oriolus* 60 : 66 - 68.
- DE SMET G., J. POLLET & de leden van het BAHC 1995. Zeldzame vogels in België in 1993. *Oriolus* 61 : 25 - 39.
- DEAN A. & L. SVENSSON 2005. 'Siberian Chiffchaff' revisited. *British Birds* 98: 396 - 410
- DEAN A.R. & L. SVENSSON 2005. 'Siberian Chiffchaff' revisited. *British Birds* 98: 396-410.
- FOUARGE J-P. 2005. Les Beccroisés. Quelle histoire! Vous avez dit: Quelle histoire? *Aves* 42:3; 209-218.
- FOX A.D. & D.A. STROUD (eds.) 1981. *Report of the 1979 Greenland White-fronted Goose Study expedition to Eqlungmiut Nunaat, west Greenland*. GWGS, Aberystrwyth
- HUYSKENS G. 1986. Het Europese Rietganzenprobleem. *Oriolus* 52: 105 - 256
- KEHOE C on behalf of the BBRC 2006. Racial identification and assessment in Britain: a report from the RIACT subcommittee. *British Birds* 99: 619-645.
- ROWLANDS A. 2003. From the Rarities Committees files: 'Black-headed Wagtail in Essex in 1999 - a suspected *feldegg* intergrade. *British Birds* 96: 291-296.
- SLATERUS R. 2007. Iberische Tijftjaffen in Nederland. *Dutch Birding* 29:2; 83-91.
- STEIJN L.B. 2005. Eastern Black Redstarts at IJmuiden, The Netherlands, and on Guernsey, Channel Islands, in October 2003, and their identification, distribution and taxonomy. *Dutch Birding* 27: 171-194.
- VAN DER VLIET R. E., J. VAN DER LAAN, M. BERLIJN & CDNA 2006. Rare birds in The Netherlands in 2005. *Dutch Birding* 28:6.
- WINTERS R 2006. Moul and plumage variation in immature Lesser Black-backed Gulls in the Netherlands. *Dutch Birding* 28:3.

Samenvatting – Abstract - Résumé

Dit 33ste rapport van BAHC en CH behandelt zeldzame vogels in 2005. Van de 130 behandelde gevallen werden er 17 niet aanvaard (d.i. 13%); twee gevallen hadden betrekking op ontsnapte vogels. Het rapport vermeldt ook enkele oudere gevallen, die nog niet gepubliceerd werden. Er was in 2005 een geval van een potentiële nieuwe soort voor België (ingediend als Vale Spotvogel *spec.*), maar dit is voorlopig nog in behandeling bij de CH. Eén soort werd recent na herziening afgevoerd van de Belgische lijst, namelijk Kleine Torenvalk.

Rare birds in Belgium in 2005

This combined report of both Belgian rarities committees (the Flemish, BAHC and the Francophone, CH) deals with 130 records of

rare birds in Belgium in 2005 or earlier (which had not yet been assessed by the committees), 2 of which were considered escapes and 17 of which were insufficiently documented.

Oiseaux rares en Belgique en 2005. Trente-troisième rapport du BAHC

Ce 33ème rapport des deux comités belges d'Homologation (le BAHC en Flandre et le CH wallon) traite 130 cas d'oiseaux rares en Belgique en 2005 ou avant. Des 130 cas, 17 (13 %) n'ont pas été acceptés et deux concernaient des oiseaux échappés. Le rapport mentionne également quelques cas anciens, non publiés.